

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-3-63 207412

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE 37-20-56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

1^{er} Supplément au bulletin N° 30 de Mars 1963
19 Mars 1963

page 52

ABONNEMENTS

Nous rappelons aux abonnés qui n'auraient pas encore renouvelé leur versement pour 1963 que ce bulletin est l'avant-dernier qu'ils recevront au titre de 1962.

Nous les invitons en conséquence à effectuer ce versement dès réception de ce bulletin sinon une interruption pourrait se produire début avril dans le service du bulletin.

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER (contaminations par les conidies sur rameaux) - Cette forme d'attaques, particulièrement fréquente dans les régions méridionales, nécessite un premier traitement assez précoce: au stade C3, c'est à dire dès que les boutons floraux apparaissent au sommet du bourgeon éclaté.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

CLOQUE DU PECHER (variétés sensibles) - Comme prévu le traitement conseillé par le bulletin du 2 mars devra être renouvelé avant l'ouverture des premières fleurs. On limitera alors la gamme des produits aux seuls organiques de synthèse; de nombreuses variétés sensibles dégagent leurs feuilles avant la floraison et sont dès lors sensibles au cuivre.

MONILIA DE L'ABRICOTIER - En règle générale, le stade "bouton rouge" est dépassé et le premier traitement a dû être appliqué. Les conditions étant de plus en plus favorables à la maturation des germes de la maladie, il devra être renouvelé à l'ouverture des premières fleurs.

MONILIA & CORYNEUM DU CERISIER - Dans les seules situations favorables où des foyers de ces maladies ont pu apparaître au cours des dernières années, on appliquera dès que les boutons floraux apparaîtront séparés un traitement au cuivre ou aux fongicides de synthèse (Captane, Thirame, Zinèbe, Ziram, Ferbam, etc...)

OIDIUM DU POMMIER - Nous attirons spécialement l'attention sur la nécessité d'appliquer les premiers traitements contre cette maladie très précocement: dès l'apparition des parties vertes. De ces traitements précoces dépend par la suite le succès de toute la campagne de défense contre l'Oïdium.

GRANDE CULTURE

CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA ET GROSSE ALTISE - Le temps actuel est très favorable à l'activité de ces ravageurs, particulièrement sur les pentes bien exposées. Un traitement devra être appliqué dès réception à l'aide d'un produit efficace à la fois contre les deux insectes (par. D p.2 et 3 et par. D p.4 de la liste).

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHILOUD

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P. LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L. BOUYX

P 353